



Conduite du verger de mai à août.

Remarque : la pluie de ce début mai donnera un excellent résultat sur le gonflement des boutons floraux.

Mai, peu de travail, possible désherbage chimique sur le rang. Traitement pour la teigne au moment du gonflement des boutons .(Bactospeine, Scutello, Dipel PM, Dipel 2X, Dipel DF, Delfin, Insectobiol, Xentari.)

Œil de paon, traitement en continu, (nombreuses compositions à base de cuivre).

Pour barrer la route à l'otiorrhynque, on pose une bande de glu sur le tronc.

Pas de traitement contre les Psylles, c'est inutile.

Pour le neiroun, couper au dessous du dernier trou à sciure, et brûler le rameau coupé, sans délai.

Juin , broyage de l'herbe ou passage du griffon.

Juillet, apport d'azote pour les arbres irrigués, Commencement de la lutte contre la mouche Dacus. Surveiller les piègeages, traitement à chaque génération...jusqu'à l'automne.

Août, élimination des gourmands, irrigation possible, mais raisonnable. Traitement de la cochenille noire par des larvicides , comme Insegar .

Ces quelques notes sont tirées d'un plan de travail paru dans « le Nouvel Olivier », ce sont des recommandations pour les produits phytosanitaires, et des données pour un itinéraire de conduite du verger.

J'ajoute que vous devez lire attentivement les notices et les *étiquettes*, afin de vous conformer sagement aux conseils mentionnés : doses, *protection* de vos yeux, de la peau, stockage hors de la portée des *enfants*.....Mais est-ce besoin de le rappeler ?